

## Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

### **BRONCOPHEN synergus pastilas**

*Thymi herbae extractum siccum*

*Tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles*

**Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.**

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis(-kusi) ārsts vai farmaceits..

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu
- Ja pēc 7 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

**Šajā instrukcijā varat uzzināt:**

1. Kas ir BRONCOPHEN synergus pastilas un kādam nolūkam tās lieto
2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanas
3. Kā lietot BRONCOPHEN synergus pastilas
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt BRONCOPHEN synergus pastilas
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

### **1. Kas ir BRONCOPHEN synergus pastilas un kādam nolūkam tās lieto**

BRONCOPHEN synergus pastilas ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles, kuras lieto kā atkrēpošanas līdzekli saaukstēšanās izraisīta klepus gadījumā.

Šī informācija balstās uz daudzu gadu lietošanas pieredzi.

### **2. Kas Jums jāzina pirms BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanas**

**Nelietojiet BRONCOPHEN synergus pastilas šādos gadījumos**

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo sastāvdaļu timiānu vai kādu citu lūpziežu (panātru) dzimtas augu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

**Brīdinājumi un piesardzība lietošanā**

Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas, Jums jāsaazinās ar ārstu.

Ja parādās elpas trūkums, drudzis vai strutainas krēpas, Jums jākonsultējas ar ārstu vai kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

**Bērni**

Tā kā pastāv veselības pastilas nejaušas norīšanas risks, BRONCOPHEN synergus pastilas nav ieteicams lietot bērniem līdz 4 gadu vecumam.

**Citas zāles un BRONCOPHEN synergus pastilas**

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

Nav zināma mijiedarbība ar citām zālēm.

**BRONCOPHEN synergus pastilas kopā ar uzturu un dzērienu**

### **Grūtniecība un barošana ar krūti**

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Drošība grūtniecības un barošanas ar krūti periodā nav noteikta.

Pietiekamu datu trūkuma dēļ lietošana grūtniecības un zīdīšanas periodā nav ieteicama.

### **Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana**

Nav veikti pētījumi par BRONCOPHEN synergus pastilu iedarbību uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

### **BRONCOPHEN synergus pastilas satur fruktozi un sorbītu.**

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kādu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas sazinieties ar savu ārstu.

## **3. Kā lietot BRONCOPHEN synergus pastilas**

Vienmēr lietojiet BRONCOPHEN synergus pastilas tieši tā, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

#### Bērni no 4 līdz 12 gadu vecumam:

Lietot 1 pastilu, ļaujot tai lēni izšķīst mutē, ik pēc 3-4 stundām (4 līdz 6 reizes dienā).

#### Pusaudži no 12 gadu vecuma un pieaugušie:

Lietot 1-2 pastilas, ļaujot tām lēni izšķīst mutē, ik pēc 3-4 stundām (4 līdz 6 reizes dienā).

#### Lietošanas ilgums:

Ja simptomi pasliktinās vai neuzlabojas septiņu dienu laikā, Jums jākonsultējas ar ārstu.

### **Ja esat lietojis BRONCOPHEN synergus pastilas vairāk nekā noteikts**

Sorbītam var būt viegla caureju veicinoša iedarbība, ja tā lietošanas deva bija 20 g dienā, kas atbilst vairāk nekā 40 pastilām.

### **Ja esat aizmirsis lietot BRONCOPHEN synergus pastilas**

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

### **Ja pārtraucat lietot BRONCOPHEN synergus pastilas**

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

## **4. Iespējamās blakusparādības**

Tāpat kā citas zāles, BRONCOPHEN synergus pastilas var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

Saistībā ar BRONCOPHEN synergus pastilu lietošanu atsevišķos gadījumos novērotas sekojošas blakusparādības:

#### *Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:*

- slikta dūša;
- vemšana.

*Imūnās sistēmas traucējumi:*

- paaugstinātas jutības reakcijas (anafilaktiskais šoks, Kvinkes tūska, nieze, izsitumi).

### **Ziņošana par blakusparādībām**

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālrunis: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: [www.zva.gov.lv](http://www.zva.gov.lv).

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

## **5. Kā uzglabāt BRONCOPHEN synergus pastilas**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Blisterus uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot BRONCOPHEN synergus pastilas pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un blistera pēc “Derīgs līdz:” vai “EXP:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## **6. Iepakojuma saturs un cita informācija**

### **Ko BRONCOPHEN synergus pastilas satur**

- Aktīvā viela ir:

1 pastila satur 59,5 mg timiāna (*Thymus vulgaris L.* un/vai *Thymus zygis L.*) lakstu sausā ekstrakta (*Thymi herbae extractum siccum*, 7-13 : 1, ekstrakts : ūdens).

- Palīgvielas ir:

Gumiarābiks (E 414), fruktoze, sorbīts (E 420), maltodekstrīns, citronskābe (E 330), saharīna nātrija sāls (E 954), aroniju aromātviela, meža ogu aromātviela, šķidrās parafīns, baltais bišu vasks (E 901), attīrīts ūdens.

### **BRONCOPHEN synergus pastilu ārējais izskats un iepakojums**

BRONCOPHEN synergus pastilas ir sūkājamas sešstūrainas brūnas pastilas.

BRONCOPHEN synergus pastilas pieejamas Al/PVH/PE/PVDH blisteros pa 20 pastilām.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

### **Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs**

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

1160 Vienna

Austrija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 04/2015